



NetPoulSafe


## PRINCIPI DI BIOSICUREZZA PER I CACCIATORI



### PUNTI CHIAVE

- Il rischio di trasferimento di agenti patogeni nell'allevamento avicolo per i cacciatori (allevatori, personale di allevamento o visitatori) che entrano in contatto con uccelli selvatici infetti o con un ambiente contaminato è elevato.
- I cacciatori devono seguire specifiche procedure di biosicurezza durante la caccia e prima di entrare in allevamento.

È assolutamente necessario che i cacciatori (allevatori, lavoratori in allevamento o visitatori), che cacciano uccelli selvatici (anatre, oche e altre specie), siano consapevoli del rischio e seguano adeguate misure di biosicurezza per ridurre al minimo la possibile trasmissione di malattie (HPAI, ND e altre) agli animali.




È necessario segnalare immediatamente all'autorità competente il ritrovamento di uccelli selvatici morti e di uccelli il cui comportamento può indicare malattie infettive (sintomi come tremori, inclinazione della testa, letargia, perdita di coordinazione, incapacità di volare o camminare o difficoltà a stare in piedi).



## Procedure specifiche di biosicurezza per i cacciatori:

- Il contatto con le carcasse di volatili selvatici deve essere effettuato esclusivamente con l'utilizzo di guanti monouso.
- Dopo ogni contatto con uccelli selvatici vivi o carcasse cacciate, lavarsi le mani con acqua e sapone e disinfettarle.
- Gli indumenti, le calzature e l'altra attrezzatura utilizzata per la caccia (che potrebbe essere contaminata) devono essere puliti e disinfettati dopo la caccia.



- Gli uccelli morti o cacciati dovrebbero essere posti in contenitori ermetici o sacchetti di plastica per prevenire la possibile diffusione di agenti patogeni attraverso il sangue o le feci.
- È vietato ai cani da caccia avere qualsiasi contatto stretto con gli animali allevati per almeno 72 ore dalla fine della caccia.
- I cacciatori (allevatori, lavoratori in allevamento o visitatori) devono rispettare un periodo in cui non hanno contatto con gli animali allevati di almeno 72 ore.



## Per maggiori informazioni:

- Progetto NETPOULSAFE : <https://www.netpoulsafe.eu>